

RAKOVINA DĚLOŽNÍHO ČÍPKU (HPV)

Rakovina děložního čípku je celosvětově druhý nejčastější typ rakoviny u žen po rakovině prsu. Příčinou vzniku onemocnění jsou virové, převážně sexuálně přenosné **lidské papilomaviry** (Human Papilomavirus, HPV), kterých existuje velké množství. HPV viry se přenáší na jak na ženy, tak i na muže, a to i od infikovaných osob, které nevykazují žádné příznaky. K přenosu infekce dochází převážně přímým kontaktem, dotykem kůže a sliznic. Infekce často probíhá bez zřetelných příznaků a po roce či dvou sama odezní. Pokud infekce přetrvá, může se projevit jako genitální bradavice (kondylomata) nebo rakovina děložního čípku, včetně předrakovinových stavů. Rakovina děložního čípku nádorovou přeměnou buněk, které se nacházejí na povrchu děložního čípku a jsou dlouhodobě infikovány HPV virem. HPV infekce může být příčinou přednádorových stavů nebo nádorů nejen na děložním čípku, ale také v pochvě, na vulvě a v oblasti konečníku. Nejširší ochranu proti HPV poskytuje očkování vakcínou Gardasil 9, která je indikována k aktivní imunizaci proti HPV onemocněním v oblasti děložního čípku, vulvy, pochvy, konečníku, a to včetně ochrany proti genitálním bradavicím.

Název očkovací látky: Cervarix

Gardasil 9

Gardasil (dříve Silgard)

Ceny očkování zahrnují i poplatek za aplikaci vakcíny a jsou konečné.

Ceny najdete v ceníku očkování – [zde](#)