

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

stanice pylové informační služby Ústí nad Orlicí

16. týden Pylová sezóna je v plném proudu, Absolutní početní převahu mají ve vzduchu pylová zrna břízy, která alergiky trápí nejvíc. Hodně je také pylu habru, jasanu, buku – pyl těchto dřevin je z alergologického pohledu středně významný. Příští období bude opět převládat pyl břízy, spektrum dalších typů pylových zrn bude i nadále bohaté a koncentrace pylu bude záviset na aktuálním stavu počasí.

Tabulka počtu sporomorf v m³ vzduchu

	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota	neděle	týdenní souhrn
bříza	10	46	20	49	603	1949	178	2855
buk	0	0	0	0	0	10	9	19
cypřišovitě	0	3	1	0	8	6	4	22
dub	0	0	0	0	0	0	1	1
habr	0	4	0	3	25	48	5	85
jasan	2	1	3	5	15	8	20	54
javor	0	0	0	0	1	2	0	3
jilm	0	1	0	0	0	0	0	1
lipnicovitě	0	0	0	0	0	0	1	1
modřín	0	0	1	1	1	1	0	4
olše	0	2	2	0	0	0	0	4
růžovitě	0	0	0	0	1	0	0	1
sítinovitě	0	0	0	1	0	0	2	3
tis	0	0	0	0	1	0	0	1
topol	0	0	1	0	0	0	1	2
vrba	0	0	1	5	2	1	4	13
Alternaria	0	0	1	2	0	0	0	3
Cladosporium	4	7	16	17	23	15	11	93
Epicoccum	0	0	0	0	0	1	0	1

