

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Stanice pylové informační služby Karlovy Vary

17. týden Různých pylových zrn je v současnosti ve vzduchu mnoho. Převahu si stále drží pylová zrna břízy, následují pylová zrna jasanu a dalších dřevin. Pylu habru, jasanu a vrby bude ubývat, naopak více bude pylu dubu i buku. Pyl již delší dobu kvetoucích ovocných dřevin se občas objeví, ale nepřináší alergikům zátěž. Pozor je třeba dávat na pylová zrna řepky, která se však do vzduchu dostávají málo a mohou citlivé osoby obtěžovat okolo polí. Koncentrace alergenů ve vzduchu je závislá na aktuálním počasí, za deště se přechodně sníží.

Tabulka počtu pylových zrn a spor v m³ vzduchu

	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota	neděle	týdenní souhrn
borovice	0	0	1	0	0	0	0	1
bříza	178	366	1504	1338	2401	1060	2318	9165
buk	0	0	2	2	4	0	5	13
cypřišovitě	1	0	4	0	2	1	0	8
dub	0	0	0	0	1	2	2	5
habr	1	0	1	0	2	0	1	5
jasan	9	14	13	5	18	15	9	83
javor	0	2	0	0	2	1	2	7
jilm	0	1	0	0	0	0	0	1
modřín	0	0	0	0	0	0	1	1
růžovitě	0	0	0	0	1	0	0	1
sítinovitě	0	0	1	0	1	0	0	2
smrk	0	0	0	0	0	0	5	5
šáchorovitě	0	0	0	0	0	1	0	1
topol	0	0	0	0	0	1	0	1
vrba	0	1	0	1	4	2	0	8
Alternaria	0	1	0	0	0	1	0	2
Cladosporium	18	52	43	20	12	23	30	198
Epicoccum	0	0	1	1	1	1	0	4

